DOCTEUR
JONATAN BELEY
CHIRURGIEN - DENTISTE
EXERCICE LIMITÉ
À LA CHIRURGIE BUCCALE
ET À L'IMPLANTOLOGIE

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'USAGE DU TABAC ET LE BON DEROULEMENT D'UN ACTE CHIRURGICAL

Vous nous avez consulté pour la mise en place d'implants dentaires et nous vous en remercions. Lors de l'interrogatoire médical, vous nous avez indiqué pratiquer l'usage d'un tabagisme actif. Selon les recommandations de l'Association Française de Chirurgie (AFC), il est établi que le tabagisme péri-opératoire augmente le risque de complications chirurgicales. On observe **2 à 4 fois plus** de complications de cicatrices, d'infections post-opératoires et de retard de consolidation osseuse.

Un arrêt du tabagisme **2 mois avant l'intervention** entraîne la **disparition** du risque de complications opératoires dues au tabac.

La poursuite de l'arrêt du tabac **1 mois après l'intervention** est nécessaire à la cicatrisation de la gencive et par conséquent favorise les suites opératoires.

La poursuite de l'arrêt du tabac **4 mois après l'intervention** est nécessaire à la consolidation osseuse et par conséquent favorise le pronostic de la survie de vos implants.

Le conseil d'une **simple réduction** de la quantité de tabac sans substituts nicotiniques avant une intervention **n'est pas suffisant**.

Je soussigné, Mr, Mme…….. certifie par la présente avoir pris connaissance des informations données par mon dentiste concernant les effets du tabac sur la chirurgie buccale.

Metz, le

Signature

3, RUE EDOUARD BELIN - 57070 METZ - TECHNOPÔLE
TÉL : 03 87 36 90 40 - FAX : 03 87 75 97 28
WWW.DR-JONATAN-BELEY.CHIRURGIENS-DENTISTES.FR - E-MAIL : SELARLREGENERATION@ORANGE.FR